

COVID-19 부스터 접종을 받아야 할 5가지 중요한 이유

1. COVID-19에 대한 면역력은 시간이 지남에 따라 감소하므로 부스터 백신을 맞아두면 추가 보호 장치를 얻게 됩니다.
2. 부스터 접종은 COVID-19에 걸려 중증으로 발전하거나 병원에 입원하거나, 급기야 사망에까지 이르는 일이 일어나지 않도록 보호하는 데 도움이 됩니다.
3. 부스터 접종을 받으면 COVID-19에 걸린 후 얻게 되는 자연 면역보다 더 강한 면역력을 얻을 수 있습니다.
4. 부스터 접종은 우리가 건강을 유지함으로써 계속해서 일하고 여행하고, 친구나 가족과 시간을 함께 보낼 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다.
5. 건강을 유지하는 사람이 많을수록 지역사회와 비즈니스 및 의료 부문에 대한 혼란이 줄어듭니다.

COVID-19에 걸렸다면 양성 검사 결과가 나온 지 3개월 후에 부스터 접종을 받을 수 있습니다.

Covid19.govt.nz에서 접종 적격성 여부를 확인해 보거나 0800 28 29 26으로 전화하십시오.



COVID-19 백신 접종에 대해 자주 묻는 질문

부스터 접종이 필요한 이유는 무엇인가요?

지금까지 밝혀진 증거에 의하면 정규 접종 코스(대다수 사람의 경우 2회 접종)를 완료한 후 감염 예방 효과는 시간이 지남에 따라 감소합니다. 정규 접종 코스 완료 후에 ‘보강’ 백신을 맞으면 COVID-19에 대한 인체의 면역력이 강화됩니다.

COVID-19 백신은 안전한가요?

뉴질랜드에서 쓰는 모든 COVID-19 백신은 Medsafe로부터 독립적인 안전성 평가를 받습니다.


Medsafe는 백신이 안전성, 효능 및 품질에 대한 엄격한 기준을 충족하는 경우에만 사용 승인을 합니다.

COVID-19 백신은 다른 모든 백신과 동일한 기준을 충족해야 뉴질랜드에서 사용 승인이 나며, 그 이후에도 안전을 위해 계속해서 모니터링이 이루어집니다.

더 나은 보호 작용을 하는 것은 획득 면역인가요, 아니면 접종 면역인가요?

COVID-19에 감염되었다고 해서 백신 접종을 받는 것과 동일한 수준의 보호 면역력을 얻지 못합니다.

감염 후 항체가 많아지지만 이 자연적 면역력이 얼마나 오래 지속되는지는 알 수 없습니다.



언제 부스터 접종을 받을 수 있나요?

16~17세

16세나 17세는 2차 정규 접종을 받은 지 6개월 후에 3차(부스터) 접종을 받을 수 있습니다.

18세 이상

18세 이상은 2차 정규 접종을 받은 지 3개월 후에 1차 부스터 접종을 받을 수 있습니다.

50세 이상

50세 이상(또는 30세 이상의 면역 기능 저하자나 의료 종사자, 노인 요양/장애인 지원 부문 종사자)은 1차 부스터 접종을 받은 지 6개월 후에 2차 부스터 접종을 받을 수 있습니다.

최근 COVID-19에 감염된 경우

하지만 COVID-19에 감염된 경우에는 양성 판정을 받은 지 최소한 3개월을 기다려야 1차 또는 2차 부스터 접종을 받을 수 있습니다.

어디서 부스터 접종을 받을 수 있나요?

많은 지역 약국과 GP 진료소에서 부스터 접종을 실시하고 있습니다. 가까운 접종 장소를 찾아 보거나 접종 예약을 하려면 [BookMyVaccine.nz](https://www.bookmyvaccine.nz)를 방문하십시오.





[Covid19.govt.nz](https://www.covid19.govt.nz)

Unite
against
COVID-19

Te Whatu Ora
Health New Zealand