

# 接种新冠疫苗加强针的5个重要原因

1. 您对新冠病毒的免疫力会随着时间的推移而降低，因此及时、按时接种加强针可提供额外的保护。
2. 加强针有助于保护您免于因新冠感染而重病、最终住院，甚至死亡。
3. 与感染新冠后获得的自然免疫力相比，加强针可以提供更强的免疫力。
4. 加强针可帮助您保持健康，因此您可以继续工作、旅行以及与朋友和家庭共度时光。
5. 我们当中保持健康的人越多，对我们的社区、企业和卫生部门的干扰就越少。

如果您感染过新冠病毒，您可以在检测呈阳性的三个月后接种加强针。

在[Covid19.govt.nz](https://www.covid19.govt.nz)查看您的资格或致电0800 28 29 26



Unite  
against  
COVID-19

Te Whatu Ora  
Health New Zealand

# 有关新冠疫苗接种的 常见问题

## 我为什么需要加强针？

现有证据显示，您在接种基础疫苗（对大多数人来说是两剂疫苗）之后，对抗感染的保护力会随着时间的推移而降低。在基础疫苗之后接种‘加强’疫苗有助增强对抗新冠病毒的免疫力。

## 新冠疫苗安全吗？

在新西兰使用的所有新冠疫苗均由新西兰药品安全局 (Medsafe) 独立评估安全性。


Medsafe只有在确信疫苗符合严格的安全、功效和质量标准时，才会核准疫苗在新西兰使用。

新冠疫苗在被批准在新西兰使用之前，与所有其他疫苗同样受到同一标准的要求，其安全性受到持续的监督。

## 什么可以为您提供更好的保护：因感染获得的免疫力或接种加强针的免疫力？

感染新冠病毒并不能提供与接种疫苗相同的保护水平。

虽然您的抗体在感染后会很高，但这种自然免疫能持续多久还未得知。



## 我什么时候可以接种我的加强针？

### 16至17岁

如果您的年龄为16或17岁，并且已经接种了前两次疫苗，您可以在第二次注射的6个月后接种第三剂(加强针)。

### 年满18岁或以上

如果您的年龄为18或以上，并且已经接种了前两次疫苗，您可以在第二次注射的3个月后接种第三剂(加强针)。

### 年满50岁或以上

如果您50岁或以上(或30岁以上且免疫功能低下、是医疗保健、老年护理或残疾工作者)，您可以在接种第一针加强针的6个月后接种第二针加强针。

### 在最近感染了新冠病毒

但是，如果您感染了新冠病毒，则需要在检测呈阳性后至少等待3个月，才能接种第一针或第二针加强针。

## 我可以在什么地方接种我的加强针？

许多当地药店和家庭医生那里都提供加强针疫苗接种。访问[BookMyVaccine.nz](https://www.BookMyVaccine.nz)查找您附近的疫苗接种点或进行预约。





[Covid19.govt.nz](https://www.covid19.govt.nz)

Unite  
against  
COVID-19

**Te Whatu Ora**  
Health New Zealand