

# 接種新冠疫苗加強針的5個重要原因

1. 您對新冠病毒的免疫力會隨著時間的推移而降低，因此及時、按時接種加強針可提供額外的保護。
2. 加強針有助於保護您免於因新冠感染而重病，最終住院，甚至死亡。
3. 與感染新冠肺炎後獲得的自然免疫力相比，加強針可以提供更強的免疫力。
4. 加強針可幫助您保持健康，因此您可以繼續工作、旅行以及與朋友和家庭共度時光。
5. 我們當中保持健康的人越多，對我們的社區、企業和衛生部門的干擾就越少。

如果您感染過新冠病毒，您可以在檢測呈陽性的三個月後接種加強針。

在[Covid19.govt.nz](https://www.covid19.govt.nz)查看您的資格或致電0800 28 29 26



Unite  
against  
COVID-19

Te Whatu Ora  
Health New Zealand

# 有關新冠疫苗接種的常見問答

## 我為什麼需要加強針？

目前證據顯示，您在接種基礎疫苗 (對大多數人來說是兩劑疫苗) 之後，對抗感染的保護力會隨時間的推移而降低。在基礎疫苗之後接種‘加強’疫苗有助增強對抗新冠病毒的免疫力。

## 新冠疫苗安全嗎？

在紐西蘭使用的所有新冠疫苗均由紐西蘭藥品安全署 (Medsafe) 獨立評估安全性。


Medsafe只有在確信疫苗符合嚴格的安全、功效和質量標準時，才會核准疫苗在紐西蘭使用。

新冠疫苗在被批准在紐西蘭使用之前，與所有其他疫苗同樣受到同一標準的要求，其安全性受到持續的監督。

## 什麼可以為您提供更好的保護 — 因感染獲得的免疫力或接種加強針的免疫力？

感染新冠病毒並不能提供與接種疫苗相同的保護水平。

雖然你的抗體在感染後會很高，但這種自然免疫能持續多久還未得知。



## 我什麼時候可以接種我的加強針？

### 16至17歲

如果您的年齡為16或17歲，並且已經接種了前兩次疫苗，您可以在第二次注射的6個月後接種第三劑（加強針）。

### 年滿18歲或以上

如果您的年齡為18或以上，並且已經接種了前兩次疫苗，您可以在第二次注射的3個月後接種第三劑（加強針）。

### 年滿50歲或以上


如果您50歲或以上（或30歲以上且免疫功能低下、為醫療保健、老年護理或殘疾工作者），您可以在接種第一針加強針的6個月後接種第二針加強針。

### 在最近感染了新冠病毒

但是，如果您感染了新冠病毒，則需要在檢測呈陽性後至少等待3個月，才能接種第一針或第二針加強針。

## 我可以在什麼地方接種我的加強針？

許多當地藥店和家庭醫生都有提供加強針疫苗接種。訪問[BookMyVaccine.nz](https://www.bookmyvaccine.nz)查找您附近的疫苗接種點或進行預約。





[Covid19.govt.nz](https://www.covid19.govt.nz)

Unite  
against  
COVID-19

**Te Whatu Ora**  
Health New Zealand